

月経初日(遅くとも2日目)から点鼻薬*1を開始

ブセレキュア

1日 3回 両鼻


(1日合計 6回スプレー)

他の薬剤を使用する場合は使用方法を確認してください
採卵前々日のオビドレル皮下注射前まで継続します

オビドレル皮下注射(採卵の36時間前)
自己注射
月 日() :
この注射以降、点鼻薬は使用しません。

×××××

生理



月経開始直前もしくは
初日に来院
(ホルモン検査、超音波検査、
点鼻薬処方)
予約項目『先採血
+ART卵胞チェック』

卵巣刺激のための注射
生理3日目まで(点鼻薬開始翌日まで)に開始します
オビドレル皮下注射当日もしくは前日まで、連日続きます

連日注射の期間中、数日おきに診察・採血があります
予約項目『先採血+ART卵胞チェック』もしくは『ART卵胞
チェック』(医師・看護師・培養士から指示があります)

採卵(予約はこちらでお取りします)
来院時間 月 日()

*1: スプレキュア、ブセレキュア、ナサニール、ナファレリールなど。使用回数は種類により異なりますので、必ず回数を確認してください。

採卵前に必ず確認してください

- ・ ART説明は受けられましたか?
- ・ 術前検査は済まされていますか?
- ・ 同意書4枚は提出されましたか?
- ・ ご主人の検体を入れる容器はお手元にありますか?